



EDERA NETWORK MARKETING
Str. N. Titulescu , Nr. 7, Bistrita, jud.BN,
Mobil: 0746-805-296; 0727-803689;
E-mail: office@edera.ro
<http://www.edera.ro>

Trebuie sa le cunosti: Boli vaginale fara simptome!

Se spune ca afectiunile genitale nu “iarta” nicio femeie, astfel pana la varsta de 30 de ani orice femeie a avut cel putin o data o infectie vaginala, indiferent daca si-a inceput viata sexuala sau nu.

Mai mult decat atat, infectiile vaginale incep de la varste tinere, fiind caracterizate de simptome minore precum jena usoara in zona vulvei sau doar modificari de secretii fara alte simptome evidente asociate. De asemenea unele infectii vaginale se dezvolta prin perturbarea florei vaginale, nefiind in mod obligatoriu boli cu transmitere sexuala. Acest amanunt este foarte important pentru cupluri atunci cand apare o afectiune de acest gen, pentru ca se pot ridica semne de intrebare cu privire la infidelitate.

Afectiunile vaginale nu se manifesta intotdeauna prin simptome evidente, dar pot evolua spre patologii importante, cum este rana pe col care poate degenera in cancer de col uterin. Nici rana pe col nu este simptomatica, de aceea este recomandat ca orice femeie sa efectueze anual analiza secretiilor si un test Babes- Papanicolau.

Afectiunile vaginale “asimptomatice” sunt considerate acele boli vaginale cu simptomatologie minima, usor de neglijat, astfel incat simptomele respective fie sunt greu de sesizat de catre femeia in cauza, fie sunt usor de ignorat.

Simptomele bolilor vaginale usor de neglijat sau greu sesizabile:

- Modificari minime ale secretiilor vaginale: fie devin mai galbene, fie mai consistente, dar nu isi modifica miroslul astfel ca nu atrag atentia femeii in cauza. De aceea este recomandat sa purtati protej-slipuri pentru a va putea controla “calitatea” secretiilor vaginale.



- Usturimi la dus in zona vaginala – apar atunci cand vulva este usor iritata si se accentueaza la folosirea sapunului;
- Jena la actul sexual, fie in timpul copulatiei, fie imediat dupa terminarea contactului sexual. Jena se manifesta fie ca usturime, fie ca arsura sau ca intepaturi dureroase la nivel vaginal;
- Durerile pelvine pot proveni de la o infectie vaginala cu manifestari atipice;



EDERA NETWORK MARKETING
Str. N. Titulescu , Nr. 7, Bistrita, jud.BN,
Mobil: 0746-805-296; 0727-803689;
E-mail:office@edera.ro
<http://www.edera.ro>

- Uneori femeia nu observa nicio modificare, dar partenerul poate avea probleme genitale ca manifestare secundara a unor boli vaginale transmise prin actul sexual.
- Uneori chiar tulburările menstruale pot proveni de la infectii în sfera genitală, asociate sau nu cu boli vaginale.

Boli vaginale fără simptome pe care trebuie să le stii

Candidoza vaginală

Candidoza vaginală apare prin multiplicarea în exces a unei ciuperci care trăiește în mod normal în flora vaginală: *Candida albicans*. Candidoza nu prezintă întotdeauna manifestări evidente astfel încât multe femei pot avea boala fără a fi conștiente de aceasta. Totuși manifestări minime pot să apară și o femeie atentă le poate observa: modificări usoare ale secretei vaginale, aceasta devine mai consistentă și mai galbenă, chiar dacă nu are încă mirosul modificat.

Candidoza vaginală este de multe ori descoperită la analiza secretei vaginală și reprezintă o patologie frecventă în randul femeilor. Uneori se poate manifesta și la bărbat, acesta prezentând la nivelul capului penian și a mucoasei peniene mici bubre roșii, uneori cu un lichid galbui, care se sparg și se descurcă. Sunt situații în care bărbatul este manifest primul, ca apoi femeia să deceleze patologia vaginală la un examen al secretei.



Vaginită cu *Gardnerella vaginalis*

De cele mai multe ori vaginită cu *Gardnerella vaginalis* nu este simptomată o perioadă lungă de timp. De fapt simptomele sunt atât de discrete încât femeile le pot sesiza cu greu sau le ignorează cu foarte multă usurință. *Gardnerella* modifică secretele vaginale din punct de vedere al consistenței și culorii: devin mai consistentă, chiar cremoase și mai galbene.

Totodată înainte sau după sangeărările menstruale secretele femeii sunt mai consistentă, astfel că de multe ori devine dificil de facut diferența între cele două consistentă. Alteori secrecia este albă și cremoasă, dar fără miros fetid. Femeia mai poate prezenta o jenă usoară după actul sexual, dar care trece rapid.

Sunt situații în care bărbatul este manifest și astfel este descoperită și vaginită la femeie. Manifestările infectiei cu *Gardnerella* la bărbat constau în apariția unor mici bubre la nivelul mucoasei peniene care se usuca și ustura, uneori penisul devine greu de decolat.



EDERA NETWORK MARKETING
Str. N. Titulescu , Nr. 7, Bistrita, jud.BN,
Mobil: 0746-805-296; 0727-803689;
E-mail: office@edera.ro
<http://www.edera.ro>

Vaginita cu Chlamydia

Vaginita cu Chlamydia poate fi asimptomatica in multe situatii, insa nu trebuie deloc neglijata pentru ca poate evolu cu boala inflamatorie pelvina si sterilitate. De aceea se insista pentru efectuarea anuala a analizelor de secretii si testul Babes-Papanicolau, iar daca ati schimbat de curand partenerul se recomanda sa mergeti la ginecolog pentru o serie de teste. De obicei unele vaginite apar la schimbarea partenerului dupa o relatie lunga.

Gonoreea

Gonoreea, denumita si blenoragie sau sculament, este o afectiune infecto-contagioasa produsa de gonococ sau Neisseria Gonorrhoeae. Nu intotdeauna este simptomatica, sunt femei nu prezinta nicio manifestare evidenta, doar secretii vaginale abundente. Totusi sunt femei care nativ au secretii vaginale abundente, astfel ca diferenta din punct de vedere clinic este foarte dificil de facut. Analiza secretiilor pune diagnosticul. Este important sa diagnosicati aceasta afectiune pentru ca poate duce la probleme grave de sanatate, infertilitate, dar si probleme in afara sferei genitale, de exemplu tulburari cardiace.



Vaginitetele alergice

Unele femei pot fi alergice sau pot face iritatii ale mucoasei vaginale la utilizarea tamponelor. Uneori manifestarile sunt discrete, dar tulburarile locale de flora duc la asocierea cu alte vaginitate bacteriene sau fungice. La utilizarea tamponelor timp prelungit, atunci cand femeile la fiecare menstruatie utilizeaza numai tampoane clasice, manifestarile alergice sau irritante devin evidente, caracterizandu-se prin dureri locale, usturimi, secretii abundente, modificate si urat mirosoitoare, durere la contactul sexual.